

予防接種チェック表

おなまえ：

生年月日： 年 月 日

ワクチン	種類	第1回目	第2回目	第3回目	第4回目
インフルエンザ 菌b型 (ヒブワクチン)	不活化	(年 月 日) 生後2か月～接種	(年 月 日) 接種間隔4週間以上	(年 月 日) 接種間隔4週間以上	(年 月 日) 3回目の接種から7か月 以上の間隔をおいて
肺炎球菌 (プレバナー)	不活化	(年 月 日) 生後2か月～接種	(年 月 日) 接種間隔4週間以上	(年 月 日) 接種間隔4週間以上	(年 月 日) 3回目の接種から60日以上の間隔をおい て、生後12か月以降(1歳になってから)
ロタウイルス (ロタテック)	生	(年 月 日) 第1回は生後6週～14週6日までに接種	(年 月 日) 接種間隔4週間	(年 月 日) 接種間隔4週間	
B型肝炎	不活化	(年 月 日) 生後2か月～接種	(年 月 日) 接種間隔4週間	(年 月 日) 初回から20～24週後に接種	
四種混合 (DPT-IPV)	不活化	(年 月 日) 生後3か月～90か月	(年 月 日) 接種間隔3週間以上	(年 月 日) 接種間隔3週間以上	(年 月 日) 3回目の接種から6か月以上 の間隔をおいて
BCG	生	(年 月 日) 生後5か月～8ヵ月未満			
麻しん風しん (MR)	生	(年 月 日) 第1期:1歳～2歳未満	(年 月 日) 第2期:保育園年長の1年間		
水痘 (水ぼうそう)	生	(年 月 日) 生後12～15ヶ月	(年 月 日) 最低3ヶ月以上、おおむね 6～12ヶ月おいて 3歳未満		
日本脳炎	不活化	(年 月 日) 3歳で1期初回(2回)を接種	(年 月 日) 接種間隔1週間以上	(年 月 日) 2回目の接種から6か月 以上の間隔をおいて 4歳～5歳	(年 月 日) 9歳～10歳(小学3年生)
二種混合 (DT)	不活化	(年 月 日) 11～13歳未満(小学6年生)			
任意接種 おたふく <small>町が全額助成</small>	生	(年 月 日) 1回目:1歳～2歳未満	(年 月 日) 2回目:保育園年長の1年間		

❖異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されています。詳しくは医師・保健師・看護師等にお聞きください。