

定期予防接種チェック表

おなまえ：

生年月日：

年

月

日

ワクチン	種類	第 1 回目	第 2 回目	第 3 回目	第 4 回目
小児用肺炎球菌 (プレベナー)	不活化	(年 月 日) 生後2か月～接種 接種間隔 27 日以上	(年 月 日) 接種間隔 27 日以上	(年 月 日) 3回目の接種から 60 日以上の間隔をおいて、 かつ標準として 12～15 カ月齢で接種	(年 月 日)
五種混合 (DPT-IPV)	不活化	(年 月 日) 生後 2 か月～接種 接種間隔 20 日以上	(年 月 日) 接種間隔 20 日以上	(年 月 日) 3回目の接種から 6 カ月以上の間隔をおいて (標準的には 12～18 か月の間) に接種	(年 月 日)
ロタウイルス (ロタテック)	生	(年 月 日) 第 1 回は生後 6 週～14 週 6 日までに接種 接種間隔 27 日以上	(年 月 日) 接種間隔 27 日以上	(年 月 日)	
B 型肝炎	不活化	(年 月 日) 生後2か月～接種 接種間隔 27 日以上	(年 月 日) 初回から 139 日以上 (20～24 週)	(年 月 日)	
BCG	生	(年 月 日) 生後 5 か月～8 ヶ月未満			
麻しん風しん (MR)	生	(年 月 日) 第 1 期：1 歳～2 歳未満	(年 月 日) 第 2 期：保育園年長の 1 年間		
水痘 (水ぼうそう)	生	(年 月 日) 生後 12～15 ヶ月 最低 3 ヶ月以上、おおむね 6～12 ヶ月おいて	(年 月 日) 3 歳未満		
日本脳炎	不活化	(年 月 日) 3 歳で 1 期初回 (2 回) を接種 接種間隔 6 日以上 (標準的 に G は 6～28 日の間隔)	(年 月 日) 2 回目の接種から 6 カ月 以上の間隔をおいて	(年 月 日) 4 歳～5 歳	(年 月 日) 9 歳～10 歳 (小学 3 年生)
二種混合 (DT)	不活化	(年 月 日) 11～13 歳未満 (小学 6 年生)			
任意接種 おたふく 町が全額助成	生	(年 月 日) 1 回目：1 歳～2 歳未満	(年 月 日) 2 回目：保育園年長の 1 年間		

☆異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されています。詳しくは医師・保健師・看護師等にお聞きください。

令和２年１０月より、「異なるワクチンの接種間隔」が下記のとおり変更になりました。

注射生ワクチン同士の接種間隔 ⇒ ２７日以上あけて接種（変更なし）

それ以外のワクチンの接種間隔 ⇒ 制限なし（変更点）

※同じワクチンの接種間隔についてはそれぞれ決まっているので、通知・配布された予防接種案内文をご確認ください。

接種ワクチン	接種期間	次に接種するワクチン
注射生ワクチン BCG・麻しん風しん（MR） 水痘・おたふくなど	２７日以上	注射生ワクチン
	制限なし	経口生ワクチン 不活化ワクチン
経口生ワクチン ロタウイルス	制限なし	注射生ワクチン 経口生ワクチン 不活化ワクチン
不活化ワクチン ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合 五種混合・Ｂ型肝炎・日本脳炎 インフルエンザなど		